

Balance Hídrico 2da Década del 11 al 20 de Enero 2024

Almacenaje en mm	
175.1 – 200.0	HUMEDAD EXTREMA
150.1 – 175.0	MUY HUMEDO
125.1 – 150.0	HUMEDO
100.1 – 125.0	NORMAL
75.1 – 100.0	SEQUIA
50.1 – 75.0	SEQUIA SEVERA
25.1 – 50.0	SEQUIA EXTREMA
< 25.0	SEQUIA ABSOLUTA

2da. Década			ESTADO DEL SUELO
Del 11 al 20 de Enero del 2024			
REGIONAL ESTE			
El Seibo	↑	65,1	SEQUIA SEVERA
Hato Mayor	↑	83,1	SEQUIA
Aeropuerto La Romana	↓	18,4	SEQUIA ABSOLUTA
Los Llanos	↑	78,8	SEQUIA
Aeropuerto Punta Cana	→	60,0	SEQUIA SEVERA
Sabana de la Mar	↓	17,8	SEQUIA ABSOLUTA
San Rafael del Yuma	→	57,7	SEQUIA SEVERA
REGIONAL CENTRAL			
Bayaguana	↓	93,9	SEQUIA
La Victoria	↑	195,3	HUMEDAD EXTREMA
Aeropuerto Las Américas	↓	65,5	SEQUIA SEVERA
Rancho Arriba	→	137,0	HUMEDO
San José de Ocoa	↓	65,2	SEQUIA SEVERA
Santo Domingo	↓	76,8	SEQUIA
REGIONAL SUROESTE			
Tabara Abajo (Azua)	↓	45,9	SEQUIA EXTREMA
Hondo Valle	↓	55,2	SEQUIA SEVERA
Padre de las Casas	↑	74,5	SEQUIA SEVERA
Peralta	→	56,1	SEQUIA SEVERA
REGIONAL SUR			
Aeropuerto Maria Montez (Barahona)	↓	133,1	HUMEDO
Polo (Barahona)	↑	155,5	MUY HUMEDO

2da. Década		ESTADO DEL SUELO
Del 11 a 20 de Enero del 2024		
REGIONAL NORCENTRAL		
Bejucal (Juma Bonaó)	→ 94,1	SEQUIA
Constanza	→ 118,0	NORMAL
Jarabacoa	↓ 69,3	SEQUIA SEVERA
La Vega	↑ 142,5	HUMEDO
Salcedo	→ 111,2	NORMAL
REGIONAL NORESTE		
Aeropuerto Arroyo Barril	↑ 150,0	HUMEDO
Rio San Juan	→ 130,1	HUMEDO
Samaná	↑ 144,4	HUMEDO
Sánchez	↓ 118,3	NORMAL
REGIONAL NORTE		
Aeropuerto Cibao (Santiago)	↑ 176,7	HUMEDAD EXTREMA
Gaspar Hernández	↓ 131,4	HUMEDO
REGIONAL NOROESTE		
Monte cristi	↑ 125,3	NORMAL
Santiago Rodriguez	↓ 19,1	SEQUIA ABSOLUTA
Villa Vásquez	↑ 76,1	SEQUIA

Análisis.

Durante la segunda década del mes de enero las precipitaciones continuaron escasas en gran parte del territorio nacional.

De **33** estaciones analizadas durante este periodo en **19** se presentan condiciones de algún grado de sequía, principalmente las localidades pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este, Central, Suroeste y Noroeste**. Entre las que mencionamos El Seíbo, Sabana de la Mar, San José de Ocoa, Bayaguana, Tábara Abajo (Azua), Peralta, Santiago Rodríguez etc.

Climatológicamente durante la segunda década del mes de enero tienden a incrementarse los valores de la sequía, en varias localidades, donde las regionales que presentan mayores afectación son la **Sur, Suroeste y Noroeste**, recordando que enero es el tercer mes del periodo de la sequía estacional para nuestro país, donde mayormente las localidades que registran mayores cobertura son Pedernales, Azua, Neiba, Barahona, Jimaní, Monte Cristi, Santiago, Distrito Nacional, San Juan de la Maguana, entre otras. (Estudio de la Climatología de la Sequía, Onamet 2005)

Continuamos recomendando las medidas de lugar para el buen manejo de las actividades agropecuarias, principalmente en las localidades pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este, Central, Suroeste y Noroeste** que están presentando valores de sequía significativos desde el periodo anterior.